

## Bristolskalan över Avföringsformer

**MOVICOL®**  
makrogol 3350 med elektrolyter

Typ 1		Separata hårda klumpar som liknar nötter	ÖKA MOVICOL® DOSEN
Typ 2		Korvformad med klumpar	ÖKA MOVICOL® DOSEN
Typ 3		Liknar en korv med sprickor på utsidan	BIBEHÅLL MOVICOL® DOSEN ✓
Typ 4		Liknar en korv, smidig och mjuk	BIBEHÅLL MOVICOL® DOSEN ✓
Typ 5		Mjuka klumpar med skarpa kanter (lätta att få ut)	MINSKA MOVICOL® DOSEN
Typ 6		Småbitar	MINSKA MOVICOL® DOSEN
Typ 7		Vattnig utan klumpar Enbart vätska	MINSKA MOVICOL® DOSEN

Distributed with the kind permission of Dr K. W. Heaton: formerly reader in Medicine at the University of Bristol. Reproduced as a service to the medical profession by Norgine Ltd. ©2017 Norgine group of companies.

# Mjukstartar hårda magar



Namn: \_\_\_\_\_

Ålder: \_\_\_\_\_

Vikt: \_\_\_\_\_

### Nästa besök

Datum	Tid

### Läs alltid bipacksedeln noga före användning

MOVICOL®, oral lösning i dospåse samt pulver till oral lösning. Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. **Indikation:** För behandling av kronisk förstoppning hos vuxna och ungdomar (12 år och över). MOVICOL® är även verksamt vid upplösning av fekalom, definerad som svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller colon. **Dosering: Kronisk förstoppning:** MOVICOL®, pulver till oral lösning: 1 dospåse 1–3 gånger dagligen. Varje dospåse löses upp i 125 ml vatten. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska läkare kontaktas. **Fekalom:** MOVICOL®, pulver till oral lösning: 8 dospåsar dagligen. 8 dospåsar löses upp i 1 liter vatten och intas inom 6 timmar. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen och det rekommenderas att man dricker 1 liter extra vätske varje dag. En behandlingskur vid fekalom ska normalt inte överstiga 3 dagar. Diagnosen fekalom måste bekräftas av läkare. **Kontraindikationer:** Använd inte Movicol vid tamperforering/obstruktion, tarmvred, svåra inflammatoriska tarmsjukdomar, toxisk megakolon eller vid allergi mot innehållsämnen. **Varningar och försiktighet:** Vätskan i MOVICOL® efter rekonstitution med vatten eller i oral lösning i dospåse ersätter inte det vanliga vätskeintaget. Absorptionen av andra medicinska produkter kan tillfälligt minskas vid användning av MOVICOL®. **Interaktioner:** Makrogol ökar lösligheten av läkemedel, som är lösliga i alkohol och relativt olösliga i vatten. **De vanligaste biverkningarna:** Buksmärta, diarré, kräkning, illamående, dyspepsi, buktidning, borborygmi, gasbildning och anorektalt obehag. **Fertilitet, graviditet och amning:** Kan användas under graviditet och amning. Det finns begränsad mängd data om effekter på fertilitet. **För mer information kontakt:** Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev. Översyn av produktresumén: Oral lösning i dospåse 16.04.2019. Pulver till oral lösning 16.04.2019. För ytterligare information se [www.fass.se](http://www.fass.se). NOR/MOV/0320/0299.

MOVICOL, NORGINE and the sail logo are registered trademarks of the Norgine group of companies.



**MOVICOL®**  
makrogol 3350 med elektrolyter

# Avföringsschema

Vecka 1	Antal påsar	Antal avföringar	Avföringstyp*)	Notering
Mån				
Tis				
Ons				
Tors				
Fre				
Lör				
Sön				

Vecka 2	Antal påsar	Antal avföringar	Avföringstyp*)	Notering
Mån				
Tis				
Ons				
Tors				
Fre				
Lör				
Sön				

\* Se Bristolskala på baksidan.

Ev. anmärkningar:

---



---



---



---

Vecka 3	Antal påsar	Antal avföringar	Avföringstyp*)	Notering
Mån				
Tis				
Ons				
Tors				
Fre				
Lör				
Sön				

Vecka 4	Antal påsar	Antal avföringar	Avföringstyp*)	Notering
Mån				
Tis				
Ons				
Tors				
Fre				
Lör				
Sön				

\* Se Bristolskala på baksidan.

Ev. anmärkningar:

---



---



---



---