

## Bristolskalan över Avföringsformer

**MOVICOL®**  
makrogd 3350 med elektrolyter

Typ 1



Separata hårda klumpar som liknar nötter

**ÖKA  
MOVICOL®  
DOSEN**

Typ 2



Korvformad med klumpar

**ÖKA  
MOVICOL®  
DOSEN**

Typ 3



Liknar en korv med sprickor på utsidan

**BIBEHÅLL  
MOVICOL®  
DOSEN** ✓

Typ 4



Liknar en korv, smidig och mjuk

**BIBEHÅLL  
MOVICOL®  
DOSEN** ✓

Typ 5



Mjuka klumpar med skarpa kanter (lätta att få ut)

**MINSKA  
MOVICOL®  
DOSEN**

Typ 6



Småbitar

**MINSKA  
MOVICOL®  
DOSEN**

Typ 7



Vattnig utan klumpar  
Enbart vätska

**MINSKA  
MOVICOL®  
DOSEN**

**MOVICOL®**  
makrogol 3350 med elektrolyter

## Läs alltid bipacksedeln noga före användning

MOVICOL®, oral lösning i dospåse samt pulver till oral lösning. Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. Indikation: Läkemedel för behandling av kronisk förstoppning hos vuxna och ungdomar (12 år och över). MOVICOL® är även verksamt vid upplösning av fekalom, definierad som svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller colon. Dosering: Kronisk förstoppning: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 1 dospåse 1-3 gånger dagligen. Varje dospåse löses upp i 125 ml vatten. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska läkare kontaktas. Fekalom: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 8 dospåsar dagligen. 8 dospåsar löses upp i 1 liter vatten och intas inom 6 timmar. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen och det rekommenderas att man dricker 1 liter extra väske varje dag. En behandlingskur vid fekalom ska normalt inte överstiga 3 dagar. Diagnosen fekalom måste bekräftas av läkare. Kontraindikationer: Använd inte MOVICOL® vid tarmperforering/obstruktion, tarmvred, svåra inflammatoriska tarmsjukdomar, toxisk megakolon eller vid allergi mot innehållsämnen. Varningar och försiktighet: Vätskan i MOVICOL® efter rekonstitution med vatten eller i oral lösning i dospåse ersätter inte det vanliga vätskeintaget. Absorptionen av andra medicinska produkter kan tillfälligt minskas vid användning av MOVICOL®. Innehåller natrium, kontakta läkare om särskilt råd att följa en diet med lågt saltinnehåll. Om förtjockningsmedel behövs för att kunna svälja annat läkemedel kan MOVICOL® motverka effekten av förtjockningsmedlet. Interaktioner: Makrogol ökar lösligheten av läkemedel, som är lösliga i alkohol och relativt olösliga i vatten. Andra läkemedel ska inte tas oralt en timme innan, samtidigt eller en timme efter intag av MOVICOL®. De vanligast biverkningarna: Buksmärta, diarré, kräkning, illamående, dyspepsi, bukdistension, borborygmi, gasbildning och anorektalt obehag. Fertilitet, graviditet och amning: Kan användas under graviditet och amning. Det finns begränsad mängd data om effekter på fertilitet. Kontakt: Norgine Sverige AB, [www.norgine.se](http://www.norgine.se). Översyn av produktresumén: Oral lösning i dospåse. 2023-03-27. Pulver till oral lösning 2023-04-19. För ytterligare information se [www.fass.se](http://www.fass.se). SE-GE-MOV-2300018

SE-GE-MOV-2300002 Nov 2023



*Because patients inspire us*

@norgine | [www.norgine.com](http://www.norgine.com)

MOVICOL, NORGINE and the sail logo are registered trademarks of the Norgine group of companies.